THUNBERG

DISSERTATIO ENTOMOLOGICA NOVAS INSECTORUM SPECIES

PARTEM TERTIAM

1784

QL
468
T53
1781
pars 3
SCNHRB

DISSERTATIO ENTOMOLOGICA

NOVAS INSECTORUM SPECIES,

SISTENS,

CUJUS PARTEM TERTIAM,

CONS. EXPER. FACULT. MED. UPSAL.,

PUBLICE VENTILANDAM EXHIBENT

PRÆSES

CAROL. P. THUNBERG,

MED. DOCT. PROF. REG. ET EXTRAORD., ACAD. CÆSAR. N. C.
REG. SCIENT. HOLMIENS., SOCIET. SCIENT. UPS. PATR.
HOLMENS. BEROL. N. SCRUT. LUND. HARLEM.
AMSTEL. ET NIDROSIENS. MEMBRUM.

ET

RESPONDENS

DAVID LUNDAHL,

SMOLANDUS.

IN AUDIT. GUST. MAJ. D. XXV. MAJI ANNO MDCCLXXXIV.

HORIS SOLITIS.

UPSALIÆ,

APUD JOHAN. EDMAN, DIRECT. ET REG. ACAD. TYPOGR.

Smithsonian Institution
RICHMOND
COLLECTION.
National Museum

QL 468 T53 1781

INSECTORUM NOVÆ SPECIES.

CIMEX.

C. ADSPERSUS: *oblongus, ſubtus cinereus nigro-punctatus, ſupra ferrugineus, fuſco marginatus.*

Corpus magnitudine *C. equeſtris*, oblongum, glabrum.

Caput ſubtus griſeum, ſupra ferrugineum marginibus fuſcis.

Roſtrum cinereum, inflexum.

Oculi nigri.

Antennae filiformes articulis quatuor, infimo nigro, reliquis rubris apice nigris, ultimo toto rubro, corpore breviores.

Thorax angulatus, convexus, ferrugineus, marginibus niger, impreſſo-punctatus.

Hemelytra ferruginea, margine exteriori fuſca, punctatiſſima.

Alæ nigræ.

Scutellum breve, ferrugineum.

Pectus & *Abdomen* cinerea, punctis minutis nigris adſperſa.

Pedes toti nigri *femoribus* muticis.

Dorſum abdominis rufeſcens ano ſupra nigro.

C. HASTICORNIS: *oblongus, rufus pectore abdomineque faſciis albis nigriſque, antennarum penultimo articulo compreſſo rotundato.* Fig. 64.

Habitat in Aitonia capenſi prope ſlangrivier promont: b: ſpei, menſe Decembri.

Corpus magnitudine *C. Perſonati*, oblongum, glabrum.

Caput teſtaceum *oculis* concoloribus vel fuſcis.

Roſtrum inflexum, fuſcum, pectore fere longius.

Antennae atrae articulis quatuor, quorum penultimus compreſſus, dilatatus & ſuborbiculatus eſt, corporis fere longitudine.

Thorax poſtice elevatus, inermis, teſtaceus.

Scutellum breve, obtuſum, teſtaceum.

Hemelytra in alterutro ſexu teſtacea, integra, in altero atra, membrana atra, immaculata.

Pectus & *abdomen* ſanguinea; inciſurae ſingulae nonotae faſcia alba, cui adjacet faſcia nigra.

Pedes toti atri *femoribus* muticis.

Antennae in hac ſpecie quam maxime ſingulares.

C. HEXOPHTALMUS: *oblongus, ſupra cinereus, ſubtus albus pectore faſciis tribus ſanguineis.*

Habitat in Capite bonæ ſpei.

Corpus magnitudine *C. annulati*, oblongum.

Caput rubrum medio nigrum.

Oculi rufeſcentes: pone ſingulum oculum puncta duo elevata, altero glaberrimo.

Antennae filiformes, nigræ.

Thorax convexus, poſtice elevatus, inermis, antice faſcia nigra ſub-abrupta, marginibus lateralibus & poſtico rubris, medio linea elevata, fuſco-cinereus.

Scutellum breve, hemelytris concolorum.

Hemelytra fuſco-cinera, margine prope membranam rufeſcente: membrana nigra.

Roſtrum

Roſtrum inflexum, nigrum, longitudine pectoris.
Pectus albidum faſciis tribus ſanguineis, obſoletis.
Abdomen albidum, immaculatum.
Pedes toti nigri *femoribus* muticis.

C. AULICUS β. CROCATUS: *oblongus, luteo nigroque varius, elytris maculis quatuor, thorace duabus croceis.* Fig. 65.

Habitat in Capite bonæ ſpei.
Corpus magnitudine C. *equeſtris*, oblongum.
Caput nigrum, macula triangulari crocea.
Roſtrum inflexum, nigrum.
Antennae filiformes, nigræ, pectore longiores.
Thorax convexus, rotundatus, inermis, ater, carinatus, margine antico maculis duabus ſub-contiguis transverſis croceis.
Scutellum breve, atrum.
Hemelytra integra, atra: ſingulum macula duplici magna, crocea, una in baſi, altera verſus membranam: membrana nigra, maculis duabus albis.
Pectus & *abdomen* atra faſciis croceis.
Pedes toti atri, *femoribus* muticis.

C. SUPERSTITIOSUS: *oblongus, rufus thorace faſcia nigra albo adjecta, elytris puncto nigro* Fig. 66.
Cimex ſuperſtitioſus. Fabricii ſpec. Inſectorum: 2. pag. 364 Syſt. Ent. p. 719.

Habitat in Capite bonæ ſpei.
Corpus magnitudine C. *equeſtris*, oblongum, glabrum.
Caput rubrum, *oculis*, *roſtro* inflexo *antennisque* nigris.

Thorax quadratus, margine undique elevato, antico margine albo adjacente faſcia nigra.
Scutellum rubrum.
Hemelytra ſanguinea puncto in ſingulo unico & membrana nigris.
Pectus & *Abdomen* tota cincta faſciis albis & nigris.
Pedes nigri, *femoribus* muticis.

C. ALBIDUS: *oblongus, rubro nigroque varius membrana hemelytrorum nivea.*
De Zierlyke Witgetipte Wantz. Stoll. Cim. p. 50. t. II. Fig. 80.
Habitat in Capite bonæ ſpei & Surinamo.
Corpus magnitudine C. *equeſtris*, totum punctis lineisque rubris nigrisque varium.
Antennæ, *roſtrum*, *ſcutellum* & *pedes* inermes toti nigri.
Caput nigrum linea poſtice nigra.
Thorax niger, lateribus antice puncto utrinque rubro, marginibus lateralibus & poſtico, lineaque media rubris.
Hemelytra rubra, margine externo & poſtico nigris, linea nigra intra marginem interiorem & alia in media cum puncto in diſco; membranæ tenuiſſimæ, niveae.
Pectus nigrum, punctis utrinque tribus coccineis.
Abdomen rubrum inciſuris tenuiſſime nigris & in utroque latere ordo duplex punctorum nigrorum.

C. ANDREÆ: *oblongus, ſanguineus hemelytris nigris, thorace cruce impreſſa.*
Varietas β. thorace nigro, obongus, C. annulato longior, totus glaber.

Habitat

Habitat in Japonia.

Nigra nitida ſunt *caput*, *roſtrum* inflexum, *antennæ*, *inciſuræ abdominis*, *pedes*, *pectus*, *thorax*, *anus*.

Thorax 4-lobus cruce impreſſa.

Scutellum bicalloſum.

Hemelytra atra, obſcura, tenuia, immaculata.

Abdomen ſanguineum, lateribus poſtice violaceo-nigris.

Baſis femorum inermium rubra, & *baſis hemelytrorum* alba.

C. PURPUREUS: *oblongus*, *ſanguineus capite membrana hemelytrorum pedibusque nigris*. Fig. 67.

Habitat in Capite bonæ ſpei.

Corpus oblongum, ſtatura *C. annulati* ſed multo anguſtius, ſanguineum, immaculatum, glaberrimum.

Nigra ſunt *antennae* filiformes, *roſtrum* inflexum, *caput* triangulare, *pedes* & *membrana hemelytrorum*.

Pedes inermes, villoſi.

Macula hemelytrorum rotunda, non exiensque ad apices, qui hyalini ſunt.

C. COLON: *oblongo-ovatus*, *rubro nigroque varius membranis hemelytrorum albis*: *puncto nigro*.

Habitat in Japonia.

Magnitudine C. campeſtris, ovato-oblongus, poſtice latior, rubro nigroque maculatus.

Antennæ filiformi-clavatæ.

Hemelytrorum membrana hyalina puncto minuto nigro.

C. AUGUR: *oblongus*, *rufus antennis*, *alis pedibusque nigris*.

De Pedel Wantz. Stoll. Cimic. p. 73. t. 18. f. 124.

De Roode Ringvalz. ibid. p. 57. t. 13. f. 89. hujus varietas videtur.

Habi-

Habitat in Capite bonæ ſpei, China & Coromandelia.
Corpus C. equeſtris majus, oblongum.
Caput triangulare, totum rubrum.
Thorax quadratus, poſtice latior, depreſſus, linea transverſa impreſſa.
Hemelytra rubra, immaculata.
Abdomen ovatum ſeu poſtice craſſius, obtuſum.

Var. α) *totus ſanguineus, exceptis antennis, membranis hemelytrorum & tibiis nigris.*

β) *ſupra ſanguineus, antennis, roſtro, pectore, inciſuris abdominis albis, pedibus & membranis hemelytrorum nigris.*

γ) *Supra rufus, ſcutello, thorace antice apicibusque antennarum nigris; ſubtus pectore, roſtro, abdomine pedibusque nigris. Abdomen poſtice nigrum; membranae hemelytrorum niveae punctis duobus fuſcis.* Fig. 68.

δ) *Hemelytris rubris membranis albis, thorace, pectore, baſi abdominis, baſi ſcutelli, antennis in medio pedibusque nigris: Abdomen apice rubrum: faſcia alba in pectore utrinque.* Fig. 69.

C. DEUSTUS: *oblongus, rufo-fuſcus ſcutelli apice, thoracis abdominisque marginibus rubris.*
Corpus magnitudine *C: hyoſcyami*, oblongum.
Caput cum *oculis* nigrum: *roſtrum* inflexum articulis quatuor, ſubulatum, nigrum.
Antennæ nigræ, filiformi-clavatæ articulis quatuor, ultimo craſſiori, cinereo.
Thorax marginatus, niger, marginibus lineaque a medio ad marginem poſticum rubris.
Scutellum nigrum, apice rubro.
Hemelytra rufeſcenti-fuſca, quaſi deuſta, lateribus rubris.

Pectus

Pectus nigrum lineis transverſis punctisque ad baſin femorum totidem rubris.

Abdomen nigrum, marginibus medioque rubris.

Pedes omnes nigri, *femoribus* dentatis ad genicula.

Similis de Roodgerande Wantz. Stoll. Cimic. p. 56. Pl. XIII. 87. ſed diverſus.

C. NEBULOSUS: *oblongus, flaveſcens thorace lineis quatuor, hemelytris faſciis tribus fuſcis.*

Habitat in promontorio bonæ ſpei.

Statura & magnitudine C. campeſtris, oblongus, totus pallide flavus, glaber.

Thorax convexus lineis quatuor fuſcis.

Scutellum lineis duabus fuſcis.

Hemelytra faſciis tribus, obliquis, fuſcis.

C. CAFFER: *oblongus, niger thorace faſcia alba, hemelytris ferrugineis: maculis quatuor albis. Fig. 70.*

Habitat in Capite bonæ ſpei.

Magnitudine & ſtatura C. arenarii, oblongus, glaber.

Caput triangulare, nigrum.

Antennæ baſi rufeſcentes, apice nigræ.

Thorax convexus, niger, poſtice faſcia alba cum puncto nigro in angulo.

Hemelytra ferruginea, obſcure albo-ſtriata: punctum album intra apicem, cui antice adjacet punctum nigrum; membrana nigra: macula alba in apice.

Pectus, abdomen & pedes atra, faſcia alba in pectore & alia in anteriori parte abdominis.

C. ANGUSTATUS: *linearis, niger capite thoraceque elongato. Fig. 71.*

Corpus magnitudine *C. tipularii*, lineare, totum atrum, glabrum.

Antennæ trium articulorum, filiformes, tenuiſſimæ.
Caput elongatum, antice triangulare, poſtice teres.
Roſtrum ſetaceum.
Oculi ab antennis remoti, medii inter caput & thoracem.
Thorax parum inæqualis.
Pedes ſetacei, longi, *femoribus* rufis, tibiis nigris.

C. OCELLATUS: *ſcutellatus*, *ſupra purpureus thorace ſpinoſo*, *ſcutello ocellis ſenis*. *Fig.* 72.

Habitat in Japonia & China.
Magnitudine C. rufipedis, oblongus, convexus.
Caput purpureum baſi lineaque violacea.
Thorax convexus, purpureus, angulis dilatatis ſpinoſis, ſpina acuta recurva nigra, antice puncta quatuor minuta nigra, poſtice maculæ quatuor luteæ.
Scutellum totum abdomen tegens, convexum, obtuſum, purpureum, ocellis ſenis iride flava, quorum tres juxta baſin, duo in medio transverſaliter oblongi, & unus infra apicem ſæpe caecutiens.
Antennæ, *caput* ſubtus, *pectus* violacea.
Femora antica rufa, poſtica baſi rubra, ceterum *pedes* violacei.
Abdomen rubrum punctis marginalibus quatuor violaceis.

MANTIS.

Os maxilloſum.
Antennæ ſetaceæ.
Thorax linearis, elongatus.
Pedes raptorii.

M. LA-

M. LABIATA: *linearis, vireſcens, inermis, capitis lateribus viridibus.*

Habitat in India orientali.

Corpus lineare, inerme, glabrum, flavo-vireſcens.

Caput oblongo-quadratum medio ſulco tenui, vireſcens, marginibus lateralibus viridibus.

Antennæ baſi luteæ, inde virides, longitudine thoracis, filiformes.

Thorax lineari-convexus, inermis, viridi-flvaeſcens, antice margine utroque ſaturate viridi.

Pedes angulati, ſimplices, inermes, virides.

Alatum inſectum non vidi.

M. PAUPERATA: *thorace apice dilatato ſpinuloſo, femoribus lobo ſimplici terminatus.*

Mantis Pauperata Fabricii ſpec. inſ. T. 1. p. 346.

Habitat in India orientali.

M. Gongylode paulo minor & auguſtior.

Capitis vertex productus, ſubulatus, bifidus, cinereus.

Thorax lineari-trigonus, apice alatus, remote ſpinuloſus, cinereus, pollicaris.

Hemelytra pallide vireſcentia, margine exteriori viridi; ante medium linea, commæ ſigno ſimilis, albida.

Pedes cinerei faſciis fuſcis: *femora* antica ſpina, reliqua ala ſimplici in latere externo notata.

Anus ſerratus.

M. MACULATA: *cinerea thorace alato ſpinuloſo, pedibus intus nigro-maculatis.*

Habitat in Japonia.

Corpus lineare, cinereum, glabrum, bipollicare.

Caput deflexum, retuſum.

Antennæ ſetaceæ thorace duplo breviores.
Thorax trigonus, marginatus, antice alatus, ſpinoſus, longitudine fere dimidia corporis.
Hemelytra cinerea, immaculata, reticulata.
Pedes antici raptorii, compreſſi, angulati; *femora* & *tibiæ* latere interiori macula & ſpinis nigris.

M. NASUTA: *cinerea thorace inermi, capite conico integro.*
Habitat in Capite bonæ ſpei & India orientali.
Linearis, inermis, glabra, cinerea, ſeſqui-pollicaris.
Caput productum, horizontale, conicum, integrum, (nec bifido vertice) convexum.
Oculi oblongi.
Thorax linearis, convexus, vix marginatus, inermis, glaber, ſemipollicaris.
Hemelytra & *alæ* cinereo-hyalina, reticulata.
Pedes ſimplices absque alis, pallidiores.

M. LOBATA: *vireſcens, capitis cornu oculisque conico-acuminatis. Fig. 73.*
Mantis lobata. Fabricii ſpec. inſ. T. 1. p. 350.
Habitat in promontorii bonæ ſpei interioribus.
Corpus pollicare, vireſcens, flavo-maculatum.
Caput deflexum, valde retuſum: ſtemmata tria nigra inter antennas: ſupra ſtemmata cornu minutum inter oculos: *oculi* ſingulares, conico-acuminati, pellucidi.
Antennæ ſetaceæ, fuſcæ, longitudine thoracis.
Thorax ovato-angulatus, convexus, inprimis antice elevatus, marginatus, ſerrulatus, vix unguicularis.
Hemelytra ſaturate viridia, reticulata, marginata: infra baſin macula minor lutea, & alia in medio magna

magna: circulo nigro & punctis duobus nigris, quorum alter oblongus.

Alæ baſi ſanguineæ, medio late nigræ, apice vireſcentes.

Pedes angulati, compreſſi, ciliati, flaveſcentes faſciis viridibus.

M. FAUSTA: *linearis, cinereo-fuſca, immaculata.*

Habitat in Capite bonæ ſpei.

Numen tutelare Hottentottorum.

Inter minores hujus generis, vix pollicaris, linearis, tota cinereo-fuſca.

Caput deflexum, retuſum antennis ſetaceis, vix thoracis longitudine.

Thorax lineari-trigonus, marginatus, integer.

Pedes angulati, tenues.

Boni ominis animal hanc ſpeciem reſpiciunt ſtupidiſſimi Hottentotti nec vel illi vel aliis, cui inſidere contigit, ullam adferunt noxam; non tamen illam, DEI inſtar, adorare ſolent.

ELATER.

Antennæ filiformes.

Corpus dorſo impoſitum exſiliens mucrone pectoris e foramine abdominis reſiliente.

E. MELANOCEPHALUS: *ruber capite, linea thoracis apiceque elytrorum nigris.*

Elater melanocephalus. Fabric. ſpec. Inſect. t. 1. p. 272.

Habitat in Capite bonæ ſpei & Coromandelia.

E. balteato paulo minor, totus ferrugineo-ruber, gla-

ber, excepto *capite*, *antennis* ſerratis, linea *thoracis*, apicibus *elytrorum* & *ano* nigris.

Thorax valde convexus, glaber: linea nigra baſin non attingit.

Elytra ſtriato-punctata.

E. DEUSTUS: *teſtaceus linea thoracis elytrorumque poſtice ramoſa, nigra.*

Habitat in Ceilona.

Inter minores ſeu *E. melanocephalo* duplo minor, tenuiſſime pubeſcens.

Caput nigrum antennis teſtaceis.

Thorax convexus, laevis, linea nigra apicem attingente.

Elytra teſtacea, ſtriato-punctata: linea nigra ſuturæ communis, & poſtice faſcia intra apices.

Abdomen fuſcum pedibus pallidis.

E. LIMBATUS: *thorace atro nitido, elytris teſtaceis: limbo nigro.*

Elater limbatus: Fabric. Spec. Inſect. T. I. *p.* 272.

Habitat in promontorio bonæ ſpei.

E. FESTIVUS: *thorace ferrugineo, elytris atris: faſciis duabus flavis. Fig.* 74.

E. Feſtivus? Fabric. ſyſt. Entom. p. 215. *ſpec. Inſect. T.* 1. *p.* 273.

Habitat in Capite bonæ ſpei.

Magnitudine E. balteati.

Caput, *antennæ*, *abdomen* nigra.

Thorax convexus, glaberrimus, ſanguineus, atomis albidis.

Elytra atra, ſtriato-punctata, baſi rubra; faſcia flava in medio vix marginem interiorem tangens, glabra

&

& alia prope apicem cinereo-flaveſcens, pubeſcens.
Pectus ſanguineum, glaberrimum.
Femora rubra fuſco-maculata, inermia.
Tibiæ albidæ.
Videtur eſſe feſtivus Fabricii, ſi magnitudo non differat.
E. 6-GUTTATUS: *ater, laevis elytris punctis ſex albis. Fig. 75.*
Habitat in Capite bonæ ſpei.
Magnitudine pulicis, totum aterrimum, nitens, læviſſimum, nudum.
Caput minimum.
Antennæ filiformes, ſubſerratæ, capitis thoracisque longitudine.
Thorax gibboſo-convexus, marginatus, poſtice in dentes exiens.
Elytra convexa, marginata, ſingulum guttis tribus minutis luteis: una in ipſa baſi rotunda, ſecunda ante medium in margine externo longitudinali, tertia pone medium transverſa.
Differt ab E. pulchello elytris laevibus, ſitu & figura macularum.
E. CLAVICORNIS: *viridis antennis clavatis.*
Habitat in India orientali.
Magnitudine ſuperat *E. pectinicornem*, totus cyaneus, glaberrimus & nitens.
Antennæ articulis 11, moniliformibus, quorum ultimi quatuor perſoliati margine clavam ovatam formant.
Thorax convexus, vix conſpicue punctatus, poſtice lobatus angulis dentatis.
Elytra minime ſtriata, ſed rugoſo-punctata.

Abdomen

Abdomen margine & ſupra luteſcens.
Femora inermia, tarſis tribus.

HISPA.

Antennæ fuſiformes.
Corpus hiſpidum.

H. CAPENSIS: *picea, hiſpida thorace ſpina palmata. Fig. 76.*

Corpus magnitudine *pediculi majoris*, totum nigrum vel piceum ſeu rufo-nigrum.
Caput parvum, inerme.
Antennæ fuſiformes ſeu ſenſim extrorſum craſſiores, articulis breviſſimis contiguis, corpore dimidio breviores.
Thorax planiuſculus, laevis, glaber: margine utrinque ſpinis quinque vel ſex, raro pluribus, quaſi e lamina propria vel centro communi prodeuntibus, acutis.
Elytra per ſeries impreſſo-punctata, ſingulo margine & ſerie triplici aculeato-ciliata, hiſpida.
Variat colore nigro & piceo.
Differt ab H. Atra: ſpina thoracis palmata & tergi, thoracis capitisque nulla.
ab H. teſtacea: colore fuſco vel piceo, thoracis ſpina palmata, lituriſque pectoris nullis.

MORDELLA.

Antennæ filiformes ſerratæ.
Caput inflexum.
Laminæ ab baſin abdominis.

M. NASUTA: *antennis pectinatis atra immaculata. Fig. 77.*
Habitat in Japonia.
Magnitudine quadrupla *M. aculeatæ*, tota atra, immaculata, glabra.

Caput

Caput depreſſum, ſingulare ut in Gryllis, fronte elevata rotundata.

Antennæ pectinatæ, capite paulo longiores.

Thorax valde convexus, antice declivus, minime marginatus, poſtice trilobo absque ſcutello.

Pectus acuminatum.

Elytra attenuata, abſque ſtriis & punctis.

Corpus craſſiuſculum abdomine obtuſo.

Alæ nigræ venis albidis, elytris longiores.

PANORPA.

Os porrectum, inflexum.
Antennæ filiformi-ſetaceæ.

P. CAPENSIS: *alis æqualibus immaculatis, corpore ferrugineo Fig. 78.*

Habitat in Capite bonæ ſpei.

Corpus oblongum, totum ferrugineum, glabrum, magnitudine *P. communis.*

Antennæ ſetaceæ, nigræ, corpore breviores.

Os porrectum ferrugineum roſtro brevi, inflexo, nigro.

Thorax lineis duabus nigris ſupra lineatus.

Alæ hyalinæ venis ferrugineis, corpore longiores.

P. JAPONICA: *alis æqualibus hyalinis: faſciis duabus atris Fig. 79.*

Habitat in Japonia.

Corpus magnitudine *P. communis*, oblongum, totum nigrum, glabrum.

Os porrectum *roſtro* corneo, inflexo, longitudine thoracis.

Antennæ filiformes, nigræ, longitudine fere corporis.

Alæ 4, æquales, oblongæ, obtuſæ, corpore longiores; hyalinæ venis nigris, apicibus faſciaque pone medium lata nigra.

Pedes pallidi.

ATTELABUS.

Antennæ moniliformes.

Caput poſtice attenuatum.

A. GEMMATUS: *ferrugineus, ſupra tuberculis nigris elevatis. Fig. 80.*

Habitat in promontorio bonæ ſpei.

Corpus magnitudine & figura *A. coryli*, totum, exceptis antennis & punctis, ferrugineum, glabrum.

Antennæ extroſum craſſiores.

Caput triangulare, poſtice anguſtatum, oculis punctisque quatuor nigris.

Thorax convexus, inæqualis punctis 6 nigris, quatuor anterioribus, duobus poſterioribus.

Elytra thorace latiora, antice angulo coſtali acuta, convexa, obtuſa, profunde impreſſo-punctata. In margine externo & apice macula nigra; praeterea punctis 13 elevatis nigris notantur, quorum 6 in ſingulo elytro, & 1 commune.

A. INDICUS: *ferrugineus capite, elytrorum baſi faſciaque cyaneis. Fig. 81.*

Habitat in India orientali.

Magnitudo & *facies A. melanuri.*

Caput ſubquadrangulare, poſtice magis attenuatum, cyaneum.

Antennæ filiformes, *maxillæ*, *palpi* rufeſcentes.

Thorax elongatus, cylindricus, utrinque ſed inprimis antice attenuatus, ferrugineus.


Elytra ferruginea, laevia, tenuiſſime ſtriata, oblique truncata, baſi & faſcia lata intra apicem cyanea.

Pedes ferruginei, ſupra genu cyanei.

Abdomen rubrum medio macula nigra.

CORRIGENDA.

Pag. 54	Lin. 28	concolorum lege concolor.
55	23	albo l. albæ.
56	22	media l. medio.
61	9	flvaeſcens l. flaveſcens.
61	14	terminatus l. terminatis.
61	17	auguſtior l. anguſtior.
66	18	vocabulum thoracis ultimo loco abſit.
67	5	trilobo l. trilobus.



Graveradt hos J. Fred: Martin.